

STUDIO MEDICO DOTT. FILIBERTO DI PROSPERO

www.studiodiprospero.it

Gravidanza fisiologica (linee guida nazionali italiane 2011 modificate).

Settimane		
0-12 Visita, P.A., calcolo B.M.I. - istruzioni su norme igieniche, alimentari, sessualità.	Gruppo Sanguigno, Fattore Rh, Test di Coombs Indiretto, emocromo, glicemia, GOT GPT, esame urine con urinocoltura, VDRL, TPHA, Toxo IgG IgM, Rosolia IgG IgM, Varicella IgG IgM, CMV IgG IgM, HIV, HBsAg, HCV. HCG Beta. Tampone vaginale.	TSH (screening) se non soffre già di malattie tiroidee; Ecografia genetica con Bi Test (11 - 12 sett); Counseling per valutazione opportunità villocentesi età \geq 36 anni al concepimento; Visita cardiologica con ECG età \geq 40 anni al concepimento; Pap Test se non eseguito negli ultimi 3 anni.
14-18 Visita, P.A. - programmazione corso accompagnamento alla nascita.	Esame urine. Toxo, Rosolia, CMV quando negativi al primo controllo.	Test di Coombs Indiretto (se Rh negativa). Curva da carico di glucosio (16-18 sett.) SOLO soggetti a rischio.
19-23 Visita, P.A.	Esame urine. Emocromo (solo se Hb < 11 nel primo trimestre). Toxo, Rosolia, CMV quando negativi al primo controllo.	Ecografia Ostetrica morfologica secondo livello con flussimetria e cervicometria (19-21 sett); Test di Coombs Indiretto (se Rh negativa).
24-27 Visita, P.A., calcolo B.M.I.	Esame urine, glicemia. Toxo, Rosolia, CMV quando negativi al primo controllo.	Test di Coombs Indiretto (se Rh negativa). Test da carico di glucosio (24-28 sett.) SOLO soggetti a rischio.
28-32 Visita, P.A. - colloquio per donazione cellule staminali da cordone ombelicale.	Esame urine, emocromo, GOT, GPT. Toxo, Rosolia, CMV quando negativi al primo controllo.	Ecografia Ostetrica(30-32sett); Test di Coombs Indiretto (28 sett TUTTE le donne). Immunoprofilassi Anti D (28 sett. SOLO Rh negative non immunizzate).
33-37 Visita, P.A.; - preparazione travaglio e nascita (34 sett.) - propedeutica al puerperio, allattamento e cure del neonato (36 sett.) - idoneità donazione cellule staminali.	Esame urine, emocromo, glicemia. Toxo, Rosolia, CMV quando negativi al primo controllo.	Test di Coombs Indiretto (se Rh negativa). Tampone vaginale e rettale per ricerca Streptococco Beta Emolitico Gruppo B (36 sett).
38-40 Visita, P.A., cardiocografia (CTG).	Esame urine. Toxo, Rosolia, CMV quando negativi al primo controllo. HBsAg, HCV, VDRL, TPHA.	Test di Coombs Indiretto (se Rh negativa).